



Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi

Milli Onkologiya Mərkəzi

AZ 1011, Bakı şəhəri, H. Zərdabi küç., 79B

Tel.: (+994 12) 537 08 11,

(+994 12) 537 08 33

Milli Onkologiya Mərkəzi

Mammoloji Mərkəz

“Qadın Dünyası”

Tel./faks: (+994 12) 530 41 65

Mob.: (+994 50) 331 43 42

E-mail: azonco@azerin.com



HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

**Qadın sağlamlığını
qoruyaq**



Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi

Milli Onkologiya Mərkəzi

MAMMOQRAFIYA

həyatı xilas edir



Süd vəzi xərcəngi nədir?

Süd vəzisi süd əmələ gətirən vəzilərdən, süd axarlarından və bunları əhatə edən birləşdirici toxumadan ibaratdır. Süd vəzi xərcəngi süd əmələ gətirən vəzilərdən və süd axarlarından inkişaf edən bədxassəli xəstəlikdir.

Risk Faktorları:

Yaş:

50 yaşından sonra qadınlarda süd vəzi xərcəngi ilə xəstələnmə təhlükəsi
50 yaşına qədər olan qadınlara nisbatən 4 dəfə çoxdur.

Ailədə süd vəzi xərcəngi:

Ailədə süd vəzi xərcəngi ilə xəstələnən varsa, sizdə də təhlükə artır. Süd vəzi xərcənginin 3-5% irdi xarakter daşıyır.

Siqaret:

Aktiv və ya passiv siqaret çəkmə süd vəzi xərcənginin əmələ galmaya riskini yüksəldir.

Reprodutiv dövr:

Erkən menarxe (menstruasiyanın 12 yaşdan tez başlaması) və gec menopauza (55 yaşdan sonra) süd vəzi xərcənginin əmələ galmaya təhlükəsini artırır. 20 yaşına gədən ilk dırı usaq doğan qadınlarda 30 yaşından sonra usaq doğan qadınlara nisbatən süd vəzi xərcəngi 2 dəfə az rast gəlinir.

Süd vəzi xərcənginin risk faktorlarının həmçinin icra olunan abortlar və süd əmizdirməmək də aiddir.

Kontraseptiv preparatların istifadə olunması:

Farglı baxışlar olmasına baxmayaraq zəif təhlükə artımı olduğu düşünülür. Kontraseptiv preparatların istifadəsi ciddi həkim nəzarəti altında icra olunmalıdır.

Estrogen hormonu ilə müalicə:

Menopauza problemlərini həll etmək üçün istifadə olunan hormon müalicəsi 5-10 ildən sonra süd vəzi xərcəngi təhlükəsini artırır. Hormon müalicəsi mütələq həkim nəzarəti altında olmalıdır.

Artıq çəkiyə səbəb olan piy toxuması artdıqca, estrogen hormonunun ifrazı da artır. Bu səbəbdən süd vəzi xərcəngi təhlükəsi da yüksəlir.

Alkoqol qəbulu

Alkoqollu içkilərin həddən artıq qəbul edilməsi süd vəzi xərcənginin əmələ galmaya riskini artırır.

SÜD VƏZİ XƏRÇƏNGİNDƏN QORXMAYIN

Təşəkkür!

"Hər kəs bilsin-HƏYAT davam etsin"
kampaniyasına verdiyiniz dəstək ilə bütün
ölkədə süd vəzi xərçənginin erkən
aşkarlanması genişləndirəcək olan "Qadın
Sağlamlığını qoruyaq" layihəsinə qoşulmuş
olacaqsınız. Ən dəyərli varlıqlarımız olan
qadınlarımız təhdid edən bu vacib sağlamlıq
uğrunda mübarizəmizdə göstərdiyiniz
yardıma görə təşəkkür edirik.



MAMMOQRAFIYA

Süd vəzilərinin muayinəsində ən
əhəmiyyətli müayinə metodlarından biridir.

Mammoqrafiya nədir?

Mammoqrafiya muayinəsi zamanı süd vəzilərinin rentgen şəklinin çəkilməsi icra olunur. Bu zaman süd vəzində olan hər hansı bir yeni törəmə və ya mikro və makrokalsinatlar aşkar olunur. Mammoqrafik müayinə 30 yaşdan sonra daha effektiv olur belə ki, yaş artırıqda süd vəzi toxumasının sıxlığı azalır və bu da rentgen şüalarının keçiriciliyini artırır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avropa ölkələrində mammoqrafiya süd vəzilərinin muayinəsi protokoluna daxil olan standartdır. Ölkəmizdə qeyd olunan normalar ilə fəaliyyət göstərən mərkəz - Milli Onkologiya Mərkəzidir.

Özünüz-özünüzü tez-tez müayinə edin.

Erkən mərhələdə diaqnoz həyatı xilas edir.



**GÜZGÜ QARŞISINDA HƏR
İKİ SÜD VƏZİNİZƏ BAXIN**



**HƏR İKİ ƏLİNİZİ BELİNİZƏ
QOYARAQ BAXIN**




**QOLLARINIZI QALDIRARAQ
BAXIN**




**SÜD VƏZİSİNİN DƏRİSİNDE
DARTILMA VARMI?**



**SÜD VƏZİSİNİN GİLƏSİNDE
İÇƏRİ BATMA VARMI?**



**SÜD VƏZİSİNİN DƏRİSİNDE
VƏ GİLƏSİNDE QIZARMA,
YARA, RƏNG DƏYİŞİKLİYİ VARMI?**



**HANSI SAHƏNİ MÜAYİNƏ
ETMƏK LAZIMDIR?**

- Aşağı sarhad - süd vəziniñ alt çizgisi - 1
- Yuxarı sarhad - körpüçük smotruy - 2
- Daxili sarhad - döş qafasının ortası - 3
- Xarici sarhad - qoltquqlının ortasında aşağı enan xallı - 4



**MÜAYİNƏ ZAMANI HANSI
BARMAQLARI İSTİFADƏ ETMƏK
LAZIMDIR?**

Şəhadat, orta, va adızs barmaqların içarı
səthini işlədin. Barmaqlar döş qafası
divarına parallel olmalıdır.



**HƏR DƏFƏ NƏ QƏDƏR
BÖLGƏNI MÜAYİNƏ ETMƏK
LAZIMDIR?**


Süd vəzisində 1 sm sahada
barmaqların ucu ilə dairələr çəkarək
hiss edin

Müayinə zamanı barmaqları nə gədər dərinə basmaliyam?

Süd vəzisindəki törəmələr fərqli dərinliklərdə yerləşə bilər.
Bu səbəbdən barmaqlarınızı eyni nöqtədə hərəkət etdirirkən 3 fərqli təzyiqlə barmaqlarınızı basın.


BİRİNCİ DAİRƏ: (yüngül təzyiq)

Birinci dairəni yüngül basaraq hərəkət edin.
Üst təbəqədəki törəmələr bu üsulla təyin edilir.
İlk dairəni çox basarkan hərəkət etsanız, üst təbəqədəki törəmə diqqətdən qaçırıla bilər.



İKİNCİ DAİRƏ: (orta dərəcədə təzyiq)

İkinci dairəda orta dərəcədə təzyiq edərək orta təbəqədəki törəmələri təyin edin. Bu zaman barmaqlar döş qəfəsi divarına parallel olmalıdır.



ÜÇÜNCÜ DAİRƏ: (güclü təzyiq)

Üçüncü dairədə qabırğa sümüklərini hiss edəcək gədər süd vəzisinə təzyiq edin. Bu zaman dərinə yerləşən törəmələri hiss edə bilərsiniz



SÜD VƏZİLƏRİNİZİ NECƏ MÜAYİNƏ ETMƏLİSİNİZ?

Şəkildəki vəziyyətdə uzanın. Qol్tuq altından başlayaraq, şəkildə göründüyü kimi eyni nöqtədən dairəvi hərəkətlərlə aşağı xəttə kimi gedin, sonra buna parallel xatt üzrə yuxarı gəlin. Şəkildəki kimi parallel xəttlər üzrə dairəvi hərəkətlər edərək davam edin.



Süd vəzi xərcəngində müayinə metodları

Süd vəzinizi alınızlə müayinə edərkən bir sərtlik hiss edirsinizsə?

Süd vəzinizi alınızlə müayinə edərkən bir sərtlik hiss edilirsa tez həyacanlanmamın, əgər bu menstruasiya dövrünü əhatə edirsa menstruasiya quratarana qədər gözlayın və təkrar müayinə edin. Bəzən menstruasiyadan avval allanın sərtlik menstruasiyadan sonra geri sorulur. Əgər sorulmasa həkimə müraciət edin.

Süd vəzi müayinəsi üçün hansı həkim müraciət etməlisiniz?

Süd vəzində baş verən dayışıklıklar sababı ilə müraciət edəcəyiniz ilk həkim-mammoloqdır.

Süd vəzisində əllə hiss edilən bərklik və ya düyün nə ola bilər?

Əlla hiss edilən törəmə kista ola bilər. Kista içi maye ilə dolu bir boşluqdur. Kista şəklində olan törəmanın xərcəng olma təhlükəsi azdır. Əllə hiss edilən törəmənin içi hüceyrələrlə dolu qatı şəkildə də olur. Bu düyündü mastopatiya, fibroadenoma və süd vəzi xərcəngi ola bilər.

Süd vəzilərinin müayinə metodları

Süd vəzilərinin əsas müayinə metodları ultrasəs müayinəsi və mammografiyadır. Gənc qadınlarda süd vəzilərinin sixlıqli yüksək olduğundan ultrasəs müayinəsi daha effektivdir. Mammografiq müayinənən fərqli olaraq ultrasəs müayinə zamanı törəmanın ölçüsü, forması və konturlarından başqa boşluqlu və ya boşluqsuz olması da müayinə edilir. 30 yaşdan sonra qadınlarda mammografiya və ultrasəs müayinəsi birlikdə aparılır.

Bu müayinələrlə dəqiq diaqnoz qoyula bilərmə?

Hər iki müayinə biza sadəcə törəmanın şəkli və xərcəng olma təhlükəsi haqqında xəbar verir, amma bu dəqiq diaqnoz deyil. Dəqiq diaqnoz yalnız mövcud törəmdən biopsiya yolu ilə qoyula bilər.

20 yaşdan yuxarı

Hər ay menstruasiyadan sonrakı həftə içində özünüzü müayinə edin.

2 ildən bir ixtisaslı həkim tərəfindən müayinə olunun.

30 yaşdan yuxarı

Hər ay özünüzü müayinə edin.

30 yaşında bir dəfə mammografiya çəkdirin.

Hər il ixtisaslı həkim tərəfindən müayinə olunun.

40 yaşdan yuxarı

Hər ay özünüzü müayinə edin.

Hər il mammografiya çəkdirin.

Hər il ixtisaslı həkim tərəfindən müayinə olunun.

Riski 30-40% azaltmaq üçün

- Artıq çəkidiən azad olun
- Meyvə-tərəvəzdən çox istifadə edin.
- İdmanla məşğul olun
- Alkoqol və siqaretdən istifadə etməyin.